

日本標準商品分類番号	
875200	
承認番号	(61AM) 3506
薬価収載	2007.7
販売開始	2007.7 *1986.10

*旧販売名による

漢方製剤

クラシエ 加味帰脾湯 エキス細粒

カ ミ キ ヒ トウ

KB-49 EK-49

〔組成・性状〕

※1. 組成

本薬1日量（7.5g）中

日局ニンジン …………… 3.0g

日局ビャクジュツ …………… 3.0g

日局ブクリョウ …………… 3.0g

日局オウギ …………… 2.0g

日局トウキ …………… 2.0g

日局オンジ …………… 1.5g

日局サイコ …………… 3.0g

日局サンシシ …………… 2.0g

日局カンゾウ …………… 1.0g

日局モッコウ …………… 1.0g

日局タイソウ …………… 1.5g

日局ショウキョウ …………… 0.5g

日局サンソウニン …………… 3.0g

日局リュウガンニク …………… 3.0g

上記の混合生薬より抽出した日局加味帰脾湯エキス
5,600mgを含有する。

添加物として日局ステアリン酸マグネシウム、日局結
晶セルロース、日局軽質無水ケイ酸、日局乳糖水和物、
含水二酸化ケイ素を含有する。

2. 製剤の性状

剤形 (色・形状)	内容量 (1包中)	識別記号
淡黄かっ色～黄かっ色の細粒 で、特異なおいがあり、味 はわずかに苦く甘い。	3.75g	KB-49
	2.5g	EK-49

〔効能・効果〕

虚弱体質で血色の悪い人の次の諸症：

貧血、不眠症、精神不安、神経症

〔用法・用量〕

通常、成人1日7.5gを2～3回に分割し、食前又は食間
に経口投与する。

なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。

〔使用上の注意〕

1. 慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）

食欲不振、悪心、嘔吐のある患者〔これらの症状が
悪化するおそれがある。〕

2. 重要な基本的注意

(1)本剤の使用にあたっては、患者の証（体質・症状）
を考慮して投与すること。なお、経過を十分に観察
し、症状・所見の改善が認められない場合には、継
続投与を避けること。

(2)本剤にはカンゾウが含まれているので、血清カリウム
値や血圧値等に十分留意し、異常が認められた場合
には投与を中止すること。

※※(3)サンシシ含有製剤の長期投与（多くは5年以上）によ
り、大腸の色調異常、浮腫、びらん、潰瘍、狭窄を伴
う腸間膜静脈硬化症があらわれるおそれがある。長期
投与する場合にあつては、定期的にCT、大腸内視鏡
等の検査を行うことが望ましい。

(4)他の漢方製剤等を併用する場合は、含有生薬の重複に
注意すること。

3. 相互作用

併用注意（併用に注意すること）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
(1)カンゾウ含有製剤 (2)グリチルリチン酸及び その塩類を含有する 製剤	偽アルドステロン 症があらわれやす くなる。また、低カ リウム血症の結果 として、ミオパチー があらわれやす くなる。〔「重大な副作 用」の項参照〕	グリチルリチン 酸は尿管での カリウム排泄促 進作用があるた め、血清カリウ ム値の低下が促 進されることが 考えられる。

4. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確とな
る調査を実施していないため、発現頻度は不明である。

(1)重大な副作用

1)偽アルドステロン症：低カリウム血症、血圧上昇、
ナトリウム・体液の貯留、浮腫、体重増
加等の偽アルドステロン症があらわ
れることがあるので、観察（血清カリ
ウム値の測定等）を十分に行い、異常
が認められた場合には投与を中止し、
カリウム剤の投与等の適切な処置を行
うこと。

2)ミオパチー：低カリウム血症の結果としてミオパ
チーがあらわれることがあるので、観
察を十分に行い、脱力感、四肢痙攣・麻
痺等の異常が認められた場合には投
与を中止し、カリウム剤の投与等の
適切な処置を行うこと。

※※3)腸間膜静脈硬化症：長期投与により、腸間膜静脈硬化症があらわれることがある。腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれた場合、又は便潜血陽性になった場合には投与を中止し、CT、大腸内視鏡等の検査を実施するとともに、適切な処置を行うこと。なお、腸管切除術に至った症例も報告されている。

(2)その他の副作用

	頻度不明
過敏症 ^{注1)}	発疹、蕁麻疹等
消化器	食欲不振、胃部不快感、悪心、腹痛、下痢等

注1) このような症状があらわれた場合には投与を中止すること。

5. 高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているので減量するなど注意すること。

6. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

妊娠中の投与に関する安全性は確立していないので、妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。

7. 小児等への投与

小児等に対する安全性は確立していない。[使用経験が少ない]

8. 臨床検査結果に及ぼす影響

本剤の投与により、血中AG (1,5- アンヒドロ-D- グルシトール) が増加する場合がある。

9. その他の注意

湿疹、皮膚炎等が悪化することがある。

〔薬効薬理〕

1. 反復寒冷ストレスマウスに対する作用¹⁾

本エキス粉末（経口投与）は、反復寒冷ストレスマウスの痛覚過敏を改善し、また、摘出腸管のアセチルコリン反応性低下を阻止した。

2. 卵巣摘出ラットに対する作用²⁾

本エキス粉末（経口投与）は、卵巣摘出ラットにLHRHアゴニストを脳室内投与し誘発した更年期障害様 hot flush モデルの尾皮膚温上昇と直腸温低下を抑制した。

〔包装〕

クラシエ加味帰脾湯エキス細粒

1. **KB-49** 3.75g×28包
3.75g×168包
2. **EK-49** 2.5g×42包
2.5g×294包
500g

〔主要文献〕

- 1) 松田理英ほか：日本薬理学雑誌，100，157（1992）
- 2) 島村美智枝ほか：和漢医薬学雑誌，14，219（1997）

〔文献請求先〕

クラシエ薬品株式会社 医薬学術部
〒108-8080 東京都港区海岸3-20-20
TEL 03(5446)3352 FAX 03(5446)3371

〔製品情報お問合せ先〕

クラシエ薬品株式会社 お客様相談センター
〒108-8080 東京都港区海岸3-20-20
TEL 03(5446)3334 FAX 03(5446)3374
〈受付時間〉10:00～17:00(土、日、祝日、弊社休業日を除く)

発売元

クラシエ薬品株式会社
東京都港区海岸3-20-20(郵便番号 108-8080)

製造販売元

クラシエ製薬株式会社
東京都港区海岸3-20-20(郵便番号 108-8080)