

Kracie

スミスリン[®]ローション5%


このお薬は**1週間ごとに1回1本塗る外用薬**です。

このお薬は、ヒゼンダニ(疥癬虫)を駆除する塗り薬です。

1回目にヒゼンダニを駆除し、**2回目**に卵からかえった幼虫も駆除します。
卵は3~5日でかえりますので、**2回目は必ず1週間あけて塗ってください**。
使用する日は、先生の指示を必ず確認してください。

首から下の全身にボトル1本分を、塗り残しのないように塗ってください。

 部分すべてに(しわの間までしっかりと)塗ってください。



※小児などは薬を減量する場合がありますので、先生の指示通りにご使用ください。

S001

ご注意ください

毎日塗るお薬ではありません。

1週間に1回、必ず指定された日に塗ってください。

すぐに洗い流さないでください。

塗ってから少なくとも**12時間以上**あけてシャワーや入浴で洗い流してください。



皮膚がただれているところや、目、粘膜には塗らないでください。

目に入った場合は、水またはぬるま湯で十分に洗い流してください。

- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 高温、直射日光をさけて、室温で保管してください。

クラシエ 薬品株式会社 お客様相談センター
〒108-8080 東京都港区海岸3-20-20
TEL 03(5446)3334
<受付時間>10:00~17:00(土、日、祝日、弊社休業日を除く)

スミスリンローション1本に1枚、本紙本ページ(片面)が付いています。

塗った日に気をつけること

- 塗った直後の手洗いはしないでください。お薬がすぐに洗い流されてしまうことを防ぐためです。そのために、塗る前にトイレを済ませておくなど気をつけてください。
- お薬を塗ったところをお年寄りや乳幼児などが誤って舐めても健康上大きな問題はありません。
- 指を舐めてしまう恐れがある場合には、舐めた部分のお薬がなくなることを避けるため、手袋等をすることも考慮してください。

お薬の洗い流し方

- 患者さまがご自分で入浴やシャワーで洗い流せない場合は、介護スタッフやご家族の方などが濡れたタオル等で拭き取ってください。
- お薬を塗った部分を拭き取る際には、あまり力強くこすりすぎないように注意してください。
- お薬を洗い流した後は、下着、ねまき、シーツ等、肌に直接つけるものはすべて、洗濯済みのものに取り替えてください。これは、肌に触れた着衣やシーツにヒゼンダニが付着している可能性があるためです。

生活上の注意（通常疥癬の場合）

- 患者さまと短時間の接触で感染することはほとんどありません。日常の生活で隔離する必要はありません。
- 介助する時は、患者さまと長時間の肌と肌の直接接触は避けてください。また、介助後は手を洗ってください。
- ヒゼンダニは人の肌を離れると、長く生きていることは出来ません。そのため部屋の清掃や衣類の洗濯などに際して、特別な対応は必要ありません。
- 入浴に際しても、特別な対応は必要ありませんが、足ふきマットやタオルなど肌に触れるものの共用は避けてください。